

Pré test DPC alcool 5/11/25

05 - 05 Nov 2025

Poll results

Table of contents

- Pré test DPC Alcool

Pré test DPC Alcool (1/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour le sevrage ?
(1/2)

VALIUM



SELINCRO (Nalméfène)



REVIA (Naltrexone)



ESPERAL



BACLOFENE



Pré test DPC Alcool (1/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour le sevrage ?

(2/2)

AOTAL (Acamprosate)



Pré test DPC Alcool (2/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour le maintien de l'abstinence ?
(1/2)

VALIUM



SELINCRO (Nalméfène)



REVIA (Naltrexone)



ESPERAL



BACLOFENE



Pré test DPC Alcool (2/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour le maintien de l'abstinence ?
(2/2)

AOTAL (Acamprosate)



Pré test DPC Alcool (3/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour la modération des consommations ?

(1/2)

VALIUM



SELINCRO (Nalméfène)



REVIA (Naltrexone)



ESPERAL



BACLOFENE



Pré test DPC Alcool (3/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux utilisés pour la modération des consommations ?

(2/2)

AOTAL (Acamprosate)



Pré test DPC Alcool (4/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux qui peuvent être utilisés chez un patient sous traitement de substitution opiacé ayant un trouble de l'usage d'alcool ?

(1/2)

. VALIUM



SELINCRO (Nalméfène)



REVIA (Naltrexone)



ESPERAL



Pré test DPC Alcool (4/7)

0 1 6

Parmi les médicaments suivants quels sont ceux qui peuvent être utilisés chez un patient sous traitement de substitution opiacé ayant un trouble de l'usage d'alcool ?

(2/2)

BACLOFENE



AOTAL (Acamprosate)



Pré test DPC Alcool (5/7)

0 1 6

Mr X dénutri et dépendant à l'alcool est admis aux urgences reçoit un traitement par Valium injectable et est réhydraté par un Glucosé. Malgré cela , il a des troubles de l'équilibre, il est apathique et confus. A quoi pensez-vous et que faire ?

(1/2)

Délirium tremens – administrer du thiamine (vitamine B1) avant le glucose



Syndrome de Korsakoff – introduire un neuroleptique



Hypoglycémie – augmenter la perfusion glucosée



Pré test DPC Alcool (5/7)

0 1 6

Mr X dénutri et dépendant à l'alcool est admis aux urgences reçoit un traitement par Valium injectable et est réhydraté par un Glucosé. Malgré cela , il a des troubles de l'équilibre, il est apathique et confus. A quoi pensez-vous et que faire ?

(2/2)

Encéphalopathie de Wernicke – perfuser du magnésium



56 %

Pré test DPC Alcool (6/7)

0 1 6

Au café, Jacques boit un ballon de rouge, Nicolas un Ricard, François un petit Baby de Whisky et Emmanuel un demi. Qui ingurgite la plus grande quantité d'alcool pur ?

A. Jacques



B. Nicolas



C. François



D. Emmanuel



Pré test DPC Alcool (7/7)

0 1 6

Selon l'OMS, quelles sont les consommations raisonnables quotidiennes et hebdomadaires ?

A. Un verre par repas sans restriction hebdomadaire

 25 %

B. Pas plus de 3 verres par jour et 14 par semaine avec 1 jour d'abstinence

 6 %

C. Pas plus de 2 verres par jour et 10 par semaine avec 2 jours d'abstinence par semaine

 69 %

D. 2 verres maximum le week end seulement

 0 %